

pallide viridis albo-striatus, intus alternatim atropurpureo- et albo-striatus, ca. 6 cm. longus, ad faucem late auriculatus, auriculis intus viridis; lamina galeatoforniculata horizontaliter protensa in lobum oblongo-ovatum ca. 4 cm. longum ca. 5.5 cm. latum verticaliter decurvum apiculo acutum desinens. Spadicis ♀ inflorescentia sessilis, conica, 2.3 cm. longa, 1.5 cm. crassa, stipite 0.5 mm. longo et crasso, appendice 5.5 cm. longo basi 1.3 cm. crasso sursum sensim attenuato apice obtuso. Pistilla oblonga summo rotundata nec pyramidalis, 4-5-ovulata.

The type specimen was collected by Mr. S. OHNUMA from Kôkô near Sinten, Præf. Taihoku, in Taiwan and cultivated in the Botanic Garden of the Taihoku Imperial University, Taihoku. The described species commonly grows in Præf. Taihoku, on the northern of Formosa; and its flowering season continues from January to the beginning of March.


雜 錄 Miscellaneous

○あさかはさうノ出産届

武蔵國淺川ノ里近クニ産スルあさかはさう (*Festuca musashiensis* HONDA) ト稱スルー禾本ノ穂ニ仔芽ガ出来テ居ルコトガ近頃 久内清孝氏ノ標本ニヨツテ分ツクノデ取り敢ヘズ紙上ヲ以テ御届ケニ及ビマス。 (本田正次)

○ひめすみれさいしん

ひめすみれさいしん (*Viola Yazawana* MAKINO) ハ明治 33-5 年頃數回ニ亘リ信州ノ戸隠山麓デ田中貢一、松岡邦松、矢澤米三郎諸氏ニヨリ發見サレタト傳ヘラレルモノデ、牧野先生ニヨリ命名サレタモノ (植物學雜誌 Vol. XVI, p. 158) デアルガ、其標本ハ廣ク傳ハツテ居ナイ様デアル。マタ、其圖モ見受ケナイガ、明治 36 年 8 月 20 發行ノ田中貢一氏著「信濃ノ花」ニ田中氏ノ詳細ナ記事ト寫生圖ガ出テ居ル。然シテ、其圖ガ參考價值ノアル唯一ノ圖ラシイガ、其書ハ現在デハ稀書ノ部類ニ屬シテ居ルノデ、茲ニ轉寫シテ一般ノ參考ニ資スルコトニシタ。尙此ノ書ニハ其他ノ植物ノ圖モアリ 記事モアルガ同時ニ純粹ニ植物記事ノミヲ書イタモノデナイカラ、植物文獻ニ數ヘ得ルカドウカハ？デアルガ、敍上ノ理由デひめすみれさいしんノ圖丈ハ是非共廣ク一般人士ニ見セテオキタイと思フ。マタ、現時ニ



Viola yasawana MAKINO in Tokyo Bot. Mag. Vol. XVI, p. 158. An only picture of this species drawn by Kôiti TANAKA is found in his "Sinano-no-hana or Flowers in Sinano" (1903)

ひめすみれさいしん 田中貢一氏著「信濃の花」ヨリ轉寫同氏圖

コデ思ヒ當ルノハ「梅檀根芽、漸漸生長、纔欲成樹、香氣昌盛」ナル觀佛三昧經ノ所説デア
ル。即チ漸漸成長シテ纔ニ樹ニ成ラント欲スル頃香氣昌盛ニナルノデアラウ、從ツテ幼本ノ
頃ニハ香ハナイノデアルマイカ。

マタ、白檀ハ半寄生植物デ主ニ禾本科植物ニ寄生スルト言ハレテ居ルガ陸軍衛生材料廠デ
ハやつてニ著ケテアル。余モ目下色々ツテ居ルガ恐ラクつくばね 同様何シニデモツクデ
アラウ。白檀ノ吸根ニ就テハ草野博士ガ植物學雜誌 (Vol. XX, p. 211) デ述ベテ居ラレ
ルガ、J. N. Rock ハ The Indigenous Trees of the Hawaiian Islands (p. 126) ニ於
テ "It has been proved in *Santalum album*, the Indian Sandalwood, that it can
exist and grow in soil perfectly devoid of foreign root" ト言ツテ居ルカラ必ラズシ
モ他ニ寄生スルヲ必要トシナイモノラシイ。余ハ目下幼本ノ移植ニ成功シタト思ツテ居ル
ガ果シテ如何ナル將來ノ結果ヲモタラスカ興味ヲモツテ見テ居ル。(久内清孝)

於テハ此ノ草本ハ山形縣ノ山地ニ
モ産スルモノト信ズ。花色ハ白色
ニシテ此ノ無花品ハあけぼのみれ
ト誤認サレ居ル様デアル。花期 5
月下旬—6 月初旬ナリ。

(久内清孝)

○梅檀ハ果シテ双葉ヨリ芳シ イカ?

昔カラ梅檀ハ双葉ヨリ芳シト云
フ。平家物語ニハ「梅檀は二葉よ
り芳しとこそ見えたれ既に十二三
にならんずる者が今は禮儀を存じ
てこそ振舞ふべきに」トアリ、源平
盛衰記ニモ「二葉より芳しくして」
トアリ、マテ「梅檀は二葉より薫
し梅花は蕾めるに香あり」ト云フ
句ガ撰集抄ニ出テ居ルト言フ、然
シテコノ梅檀ガ今言フ白檀ノコト
デアラウガ其梅檀即チ白檀ハ果シ
テ二葉カラ芳シデアラウカ? 余
ハ先ヅ白檀ノ實生ヲ作ツテ見タガ
雙葉ハ勿論幼本デハサツバリ香ナ
イ。更ニ切片ヲ作ツテ檢鏡シタガ
何モソレラシイモノハ見エナイソ